

Cultures

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du seminaire 94516 RUNGIS cedex Tél 01-41-73-48-00 Fax 01-41-73-48

Imprime à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant J. BOULUD

Publication périodique C.P.P.A.P n°0904 B 00536 ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 360 F Fax 135 F

AVERTISSEMENTS

PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 23 du 4 juillet 2000 - 1 page Numéro ordre postal : 44

Maïs

Ravageurs

Les populations de pucerons atteignent désormais de 0 à 100 individus / plante. Si on rencontre surtout Métopolophium dirhodum et Sitobion avenae, on trouve aussi maintenant quelques Rhopalosiphum padi (puceron vert avec arrière abdomen rougeâtre) dans les feuilles du cornet. Exemple à Montereau (77), Chailly en Brie (77).. Ce puceron sera à surveiller à la floraison, surtout derrière des application d'insecticide liquide.

Pour la pyrale, le vol continue dans certains secteurs (voir tableau) et les premières captures viennent d'être enregistrées à Gometz la ville (91), Poigny (77). Un cas de figure rend les préconisations délicates celui des situations où le vol avait débuté il y a 3-4 semaines, et où l'on capture plus rien depuis 2 semaines. Exemples dans le sud-est Seine et Marne (Mons et Montois, Passy / Seine) et le sud Essonne (Mespuits, Videlles, ..). L'observa-

tion des pontes peut permettre de juger l'opportunité du traitement.

Hormis les situations «tardives», les traitements nécessaires devront commencer à être réalisés dès que les conditions climatiques le permettront.

Betteraves

Noctuelles

Les chenilles vertes de noctuelles défoliatrices sont maintenant présentes dans de très nombreuses parcelles de la région. Exemples relevés hier:

à Congerville (91), 8 chenilles pour 10 pieds, à Montereau (77), 1 chenille pour 10 pieds, à Egreville (77), Dammartin en Goêle (77)...

Surveillez attentivement vos parcelles. Intervenez en cas de présence de nombreuses chenilles, le soir de préférence (activité surtout nocturne).

Il n'est pas justifié d'apporter par la même occasion un fongicide, la situation étant saine à l'heure actuelle. L'oïdium apparaît au plus tôt au 10-15 juillet, au plus tard dans la première décade d'aôut.

Pois

Ravageurs

Les captures ont parfois été très élevées cette dernière semaine. Quelques situations approchent le seuil de 400 captures cumulées, mais trop tard par rapport au stade du pois.

Captures hebdomadaires de pyrale réseau SRPV - CAIF

ité du traitement.	Lieu	31/5-6/6	7-13/6	14-20/6	21-27/6	28/6-4/7
ormis les situations ardives», les traite- ents nécessaires de- ent commencer à être elisés dès que les con- ions climatiques le rmettront.	77-Beton Bazoches		0	3	3	1
	77-Citry / Marne	0	0	19	3	2
	77-Crisenoy	1	5	10	9	12
	77-Crouy / Ourcq		0	1	1	0
	77-Iverny	0	0	0	0	0
	77-Lorrez le bocage		4	1	7	
etteraves	77-Mons en Montois	3	1	0	0	0
	77-Passy / Seine	0	0	8	0	0
octuelles s chenilles vertes de ctuelles défoliatrices et maintenant présen- dans de très nom- euses parcelles de la gion. Exemples relevés er: Congerville (91), 8 enilles pour 10 pieds, à ontereau (77), 1 che- le pour 10 pieds, à Egre-	77-Poigny	0	0	0	0	2
	77-Presles en Brie	0	0	1	0	2
	78-Ablis		0	3	0	0
	78-Longnes		0	1	2	5
	78-Marcq		0	1	2	0
	91-Abbeville la rivière		1	6	6	22
	91-Cheptainville Bn F	0	0	10	0	
	91-Gometz S&		0	0	0	2
	91-Mespuits	1	1	1	0	0
	91-Videlles	0	2	4	0	0
30- 48744	03					



Maïs Situation pyrale.

Betteraves Attention aux noctuelles.